

**ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦЫ НЕКОТОРЫХ ТАКСОНОВ
СЕМЕЙСТВА LOGANIACEAE R. BR. EX MART. ФЛОРЫ
КИТАЯ, ХРАНЯЩИЕСЯ В ГЕРБАРИИ БОТАНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА ИМ. В. Л. КОМАРОВА (LE)**

**TYPE SPECIMENS OF SOME TAXA OF FAMILY
LOGANIACEAE R. BR. EX MART. OF THE CHINA FLORA
KEPT IN THE HERBARIUM OF KOMAROV BOTANICAL
INSTITUTE (LE)**

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Гербарий высших растений
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 2
raenkol@mail.ru

Приведены данные о хранящихся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE) типовых образцах 6 видов рода *Buddleja* L., описанных с территории Китая; для *B. officinalis* Maxim. выбран лектотип.

Ключевые слова: *Loganiaceae*, *Buddleja*, Ботанический институт им. В. Л. Комарова (LE), флора Китая, типовые образцы, типификация.

В настоящей статье публикуются типовые материалы семейства *Loganiaceae* R. Br. ex Mart., выявленные нами при каталогизации типовых образцов таксонов флоры Китая, хранящихся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE). В статье приведены сведения о типовых образцах 6 видов рода *Buddleja* L., описанных с территории Китая; для одного из них (*B. officinalis* Maxim.) нами выбран лектотип.

Перечень типовых образцов представлен в алфавитном порядке названий типифицируемых таксонов и включает в себя следующие сведения: название таксона с указанием первоисточника; принятое в издании «Flora of China» (Ping-tao Li, Leeuwenberg, 1996) название растения (после знака равенства); категория типа; число гербарных листов (для синтипов); фамилия специалиста, обозначившего лектотип; полный текст гербарной этикетки; цитата из протолога.

Buddleja L.

1. *B. alternifolia* Maxim., 1880, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 26, 3: 494 («*Buddleia*»).

Holotypus: Сев.-Зап. Китай, пров. Ганьсу, «China, prov. Kansu, ad latere australi fl. Hoangho ad orient. [urb.] Santschou, 13/25 VI 1875 [fl.], Dr. Piasezky» (LE).

По протологу: «In Chinae occidentalis prov. Kansu, latere australi fl. Hoangho, sinice: ti-gu-dou (Piasezky)».

Примечание. На гербарном образце голотипа имеется полевая этикетка П. Я. Пясецкого: «голубые цв., рудер.: на пригорках и дорогах».

2. *B. lavandulacea* Kränzl., 1913, Bot. Jahrb. 50. Beibl. 111: 45 («*Buddleia*»). = *B. paniculata* Wall. ex Roxb, 1820, in. Carey a. Wallich, Fl. Ind. 1: 412 («*Buddleia*»).

Isotypus: Юго-Зап. Китай, пров. Юньнань, «China, prov. Yunnan, Mengtze..., 4500' [fl.], № 10178, A. Henry» (LE).

Holotypus: K; isotypi: E, NY.

По протологу: «China: Prov. Yun-nan, Meng-tze, 1500 m (4500') above the sea (Henry n. 10178!)».

3. *B. lindleyana* Fortune, 1844, Lindl. Bot. Reg. 30: Misc. 25 («*Buddleia*»).

Isonotypus (Leeuwenberg, 1979: 129): Вост. Китай, пров. Аньхой, «China, Chusan, 1845, № 37, Fortune» (LE).

Neotypus: CGE; isoneotypi: BM, G, GOET, K, OXE, P, W.

По протологу: «Its seeds were put into the post in Chusan on the 13th November, 1843, and on the 4th March, 1844, they were actually growing in the garden of the Horticultural Society».

4. *B. officinalis* Maxim., 1880, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 26, 3: 496 («*Buddleia*»).

Lectotypus (Raenko, hoc loco; «holotypus» fide Leeuwenberg, 1979: 140): Сев.-Зап. Китай, пров. Шэньси, «China, prov. Schensi, ad fl. Han, inter oppidum Pei-ho-fan et Sin-Jan-fan in danlioitath. lapidosis, ad muns. Sinice: mun-chua, planta officinalis, 8/20 III 1875 [fl.], Dr. Piasezky» (LE), cum icon. auct.

Syntypi 2: Сев.-Зап. Китай, пров. Шэньси, «China, prov. Schensi, ad fl. Han inter oppidum Jun-Jan-fu ad muns..., 27 II / 11 III 1875 [fl.], Dr. Piasezky» (LE).

Syntypus: Сев.-Зап. Китай, пров. Ганьсу, «China, prov. Kansu, maxime australi, 30 V / 11 VI 1875 [fr.], Dr. Piasezky» (LE).

Syntypus: Сев.-Зап. Китай, пров. Ганьсу, «China, prov. Kansu, australi, 3/15 VI 1875 [fr.], Dr. Piasezky» (LE).

По протологу: «In Chinae occidentalis prov. Schensi et Kansu; urbem Han-kau advehitur, officinalis, sinice: mun-chua (Piasezki)».

Примечание. Типовой материал смонтирован на двух гербарных листах, на одном из них вместе с лектотипом помещен синтип из провинции Шэньси.

5. *B. stenostachya* Rehder et Wilson, 1913, in Sargent, Pl. Wilson, 1: 565 («*Buddleia*»). = *B. nivea* Duthie, 1905, Gard. Chron. Ser. 3, 38: 275, fig. 102 («*Buddleis nivea*»).

Isotypus: Юго-Зап. Китай, пров. Сычуань, «China, 10 VIII 1907–09 [fl.], № 1351, E. H. Wilson».

Holotypus: A; **isotypi:** BM, HBG, K, W.

По протологу: «Western Szech'uan: Mupin, thickets, alt. 1300–1600 m, October 1908 (No. 1351, type). Cultivated at the Arnold Arboretum, September 10, 1912 (flowering specimens)».

6. *B. variabilis* Hemsl., 1889, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 26: 120 («*Buddleia*»). = *B. davidii* Franch. 1888, Pl. David. ex Sinarum Imp. in Nouv. Arch. Mus. Paris. Sér. 2, 10: 103 («*Buddleia davidii*»).

Isolectotypus («isotypus» fide Leeuwenberg, 1979: 113): Центр. Китай, пров. Хубэй, «China, Hupeh, Ichang. III 1886 [fl.], № 156, A. Henry».

Lectotypus: K; **isolectotypus** («isotypus» fide Leeuwenberg, 1979: 113): P.

По протологу: «Hupeh: Ichang, Nanto and mountains to the north-ward (Henry 156, 1069, 2060, 2351, 2668, 3110 A, 3110 B!); Szechuen: Mount Omei at 6000 feet (Faber!)».

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 06-04-48299).

Литература

Leeuwenberg A. J. M. The *Loganiaceae* of Africa. XVIII *Buddleja* L. II Revision of the African and Asiatic species // Meded. landbouwhogeschool Wageningen. 1979. Vol. 79. N 6. 163 p. — Li Ping-tao, Leeuwenberg A. J. M. Fam. *Loganiaceae* // Flora of China. Beijing; St. Louis, 1996. Vol. 15. P. 329–337. — Rehder A., Wilson E. H. *Loganiaceae* // C. S. Sargent. Plantae Wilsonianae. 1913. Vol. 1. P. 563–572.

Summary

Data are presented on type specimens of 6 species of the genus *Buddleja* L. described from China and kept in the Herbarium of Komarov Botanical Institute (LE); the lectotype of *B. officinalis* Maxim. is selected.

Key words: *Loganiaceae*, *Buddleja*, Herbarium of Komarov Botanical Institute (LE), flora of China, type specimens, typification.